

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 infeksjon.

For de under 65 år som er vaksinert med to doser, samt gjennomgått infeksjon er det ikke nødvendig med en oppfriskningsdose. Dette gjelder så lenge infeksjonen er gjennomgått minst 3 uker etter 2.dose er gitt. Gjennomgått infeksjon vil da tilsvare en vaksinedose. Har du fått påvist smitte under 3 uker etter dose 2 anbefales oppfriskningsdose.

For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 mnd. fra dose 2.

Hos personer over 16 år som har gjennomgått covid-19 infeksjon anbefales det kun en vaksinedose for å ansees som grunnvaksinert. Dette er uavhengig av hvor lenge det er siden gjennomgått infeksjon. Det anbefales at vaksinedosen avventes til det har gått minst 3 måneder etter tilfriskning.

Gjennomgått infeksjon og koronapass

EU har besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (2.doser) ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test.

Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal *ikke* gis før det har gått 3-4 uker etter infeksjon, men anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

Ved ønske om vaksine eller spørsmål kan vi nås på vaksinetelefonen (47763197) mandag-torsdag mellom kl 14:30- 15:30.

Helse- og omsorgsetaten/v Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten.